



高雄市立小港醫院（委託私立高雄醫學大學經營） 大腸癌標靶治療-Bevacizumab（Avastin®癌思停）

標靶藥物是對於癌細胞的作用專一性高於正常健康細胞，相較於傳統化學治療可減少對正常細胞的傷害，進而減少副作用，因此標靶治療成為癌症治療的另一個新選擇。

一、藥物簡介

標靶治療藥物癌思停（Avastin）是藉由抑制腫瘤血管的新生作用，使腫瘤無法得到營養的供應，抑制癌腫瘤細胞生長。

二、副作用及處置

癌思停（Avastin）標靶藥物治療期間，不是每位施打病患都會出現副作用，每個人的副作用也不盡相同。常見的副作用：

- (一) 高血壓，需定期監測血壓；必要時，需降血壓藥物服用。
- (二) 疲倦、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘。
- (三) 頭痛、頸部僵硬、面潮紅。
- (四) 手術後傷口不易癒合。
- (五) 手或腳感到麻木或刺痛。
- (六) 腸穿孔。
- (七) 流鼻血或牙齦出血。

三、注意事項

- (一) 懷孕期間不應使用 Avastin，建議有生育能力的女性在 Avastin 治療期間應採取適當的避孕措施，避孕措施應持續至接受最後一劑 Avastin 後 6 個月以上。因胎兒生長中對抗血管生長因子極為敏感，故孕婦或即將懷孕者不可施打此藥。
- (二) 標靶藥物為對抗血管生長因子，會阻礙傷口癒合，故外科手術後的 28 天內或手術傷口未癒合前，不應使用此藥。
- (三) 若有服用抗凝血藥物或消化道潰瘍病史，請告訴您的主治醫師，以審慎評估用藥，在治療期間出現三級或四級出血的患者應永久停用 Avastin。

若您返家後有任何疑問，歡迎洽詢電話：(07) 8036783轉3608、3609(6N病房)或3552、3553(5N病房)

小港醫院外科病房 關心您