



高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

靜脈植入式注射座 (Venous port-A Catheter) 照護須知

「靜脈植入式注射座」是一種植入體內的人工血管通路，為需要長期及重複進行靜脈穿刺注射的病友設計。透過注射座中央的穿刺隔膜和導管，可以注射藥物、血液製品及長期靜脈營養輸液等。

「靜脈植入式注射座」可分為圓盤和導管部分：圓盤的大小如十元硬幣，高度約2公分，外型有如聽診器一般，它是一種矽質的橡皮，與人體組織可共存不會發生排斥現象，且不影響日常生活。

一、如何裝置靜脈植入性注射座

注射座植入是須利用手術方式在開刀房內進行置入，醫師會為您進行局部麻醉處理，然後在預定植入部位皮膚處(一般為鎖骨下方)切開5-7公分的傷口，將導管插入血管內，再將注射座植入皮下。依皮膚組織厚度，癒合後皮膚約可見一條疤痕及略似十元硬幣大小之圓形凸起。

二、手術前後照護須知

(一)手術前準備

1. 經醫師及麻醉醫師評估及說明後，請您填好麻醉及手術同意書，由醫師畫上手術標記，切記不可自行將手術標記記號擦洗掉。
2. 請依醫護人員的指示時間開始禁食，護理人員會為您置入靜脈留置針，輸注靜脈輸液。
3. 手術前需取下身上飾品、隱形眼鏡、假牙、髮夾、彩繪指甲等，並更換手術服及戴手術帽，若有貴重物品請家人代為保管。

(二)手術後須知

1. 術後當天，會照胸部X光，以確認導管位置正確。
2. 手術後約7-10天即可拆線，在拆線前傷口不可碰水或泡澡，並隨時保持傷口清潔與乾燥，注意觀察傷口是否有紅、腫、熱、滲血、疼痛及肢體水腫情形，若有上述情形應告知醫護人員。
3. 拆線後傷口皮膚不需再特別處理，只需保持清潔與乾燥。

三、返家後日常生活注意事項

- (一)裝置注射座的手臂應避免360度旋轉、過度用力或激烈的擴胸伸展運動，如：游泳、瑜伽、有氧運動、打高爾夫球及提重物或舉重超過5公斤等動作，以預防注射座移位、導管脫落、導管扭曲等問題發生，除此之外，一般日常生活不受影響。
- (二)觀察傷口有無紅腫熱痛，注射座周圍皮膚避免潮濕，若有出現紅腫熱痛或全身發冷發熱以及頸部或手臂出現腫脹情況時，應立即返院請醫師診視。
- (三)不可自行從注射座注射藥物、在注射座部位附近針灸或塗抹任何未經醫師許可的藥物或敷料，因上述的行為皆可能引起注射座的感染或阻塞。
- (四)若注射座長期不使用時（超過28天），建議需每個月或依醫師指示返回門診沖洗導管，以避免管路出現阻塞或凝血的情形。

若有任何問題請電洽：(07)8036783#3822

小港醫院內科關心您