



高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)
玻尿酸填充注射

玻尿酸是”Hyaluronic acid”，又稱為透明質酸或醣醛酸，為天然多醣類，由微生物發酵或動物來源萃取而得。玻尿酸填充注射是皮下植入注射劑為無菌性凝膠，其作用原理是運用增加皮膚或嘴唇容積，重建皮膚輪廓或增加嘴唇豐盈程度，故請注意以下事項：

一、適應症

- (一)隆鼻、隆下巴、蘋果肌
- (二)靜態皺紋、法令紋、嘴角紋
- (三)皮膚凹陷(顳部、眼窩)、痘疤、補坑洞
- (四)豐唇、豐頰、填淚溝(黑眼圈)、提眉、改善嘴角下垂

二、禁忌症

- (一)懷孕或哺乳者
- (二)自體免疫疾病患者，如：紅斑性狼瘡
- (三)嚴重性皮膚病變者、蟹足腫體質、治療部位有傷口者
- (四)如使用Aspirin及其他抗凝血劑，可能會增加注射部位瘀青及出血風險，請主動告知醫師

三、治療前

- (一)臉部清潔、拍照，塗抹局部麻醉藥膏，約停留需20-30分鐘。
- (二)治療時間，依治療範圍大小約15-20分鐘不限。

四、治療後

- (一)當天請勿化妝、按壓或搓揉注射部位、喝酒及避免激烈運動
- (二)1~2天可使用水及洗面乳清潔及輕揉卸洗。
- (三)注射部位約3~5天會輕微紅、脹痛、搔癢及緊繃觸感情形

屬正常現象，如有紅腫情況可冰敷減緩不適；腫脹與瘀血注射後約1~2週可減緩症狀，若注射部位嚴重泛白、劇烈痛或皮膚壞死等，請立即回診就醫。

- (四)一週內，應避免暴露在高溫場所、如三溫暖、暖爐、烤箱、泡溫泉、蒸氣室、日光浴或到極冷環境，有可能會使填充物與皮膚組織結合前發生質變。
- (五)如曾有臉部皰疹問題，扎針處引發皰疹復發危險性，極少數者可能出現立即性或遲發性過敏性、膿瘍及肉芽腫等風險。
- (六)玻尿酸效果可維持約6~12月左右，因個人體質其維持有效時間也不同，玻尿酸可自然被人體吸收代謝，其效果逐漸消失。
- (七)玻尿酸皮下植入物注射後，如有視力模糊、口齒不清或半邊臉部麻痺等症狀產生請立即回診就醫。

若有任何疑問，請撥諮詢專線：(07)8059116、8036783轉3830、3831
“小港醫院美容醫學中心關心您”