



高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

肺部軟式支氣管鏡檢查前後衛教

一、為什麼要做支氣管鏡檢查?

(一) 診斷上的適應症有:

- (1) 不明原因之咳血、慢性咳嗽、聲音沙啞或呼吸困難。
- (2) 肺部結節或腫瘤之鑑別診斷。
- (3) 肺癌患者臨床分期之依據。
- (4) 良性支氣管病變之診斷，如肺結核、呼吸道吸入性傷害、氣管或支氣管狹窄等。
- (5) 診斷瀰漫性肺部疾病。

(二) 治療上的適應症有:

- (1) 移除氣管內異物。
- (2) 抽取氣管內分泌物及血塊。
- (3) 配合雷射或電燒裝置切除支氣管內腫瘤或肉芽組織。
- (4) 氣管狹窄病患可施行擴張術或放置氣管內支架。

二、檢查前要注意什麼?

- (1) 經醫師解釋說明後，請填寫支氣管鏡檢查同意書，填寫前請您看清楚同意書背面支氣管鏡檢查說明，若有疑問可即時請問醫師。
- (2) 檢查前 4 小時不要吃任何東西，包括水等液體食物，以免檢查時嘔吐造成吸入性肺炎。
- (3) 請取下假牙或鬆動的牙齒，以免移位而阻塞呼吸道
- (4) 最好有家屬陪同檢查。
- (5) 若您在檢查前有呼吸急促、胸部不適等情況，請先主動告知醫師。

三、檢查進行時要注意什麼?

- (1) 請放鬆心情，並配合醫師指令，整個過程約 30 分鐘。
- (2) 我們會先在您的口鼻部噴局部麻醉劑，會有一些麻苦嗆辣感，但可以減少作嘔感覺及咳嗽。若您有對任何

藥物過敏的病史，請先告知醫師。

- (3) 肺部支氣管鏡會經由您的鼻腔進入經過聲帶進入氣管、支氣管，請您放輕鬆，此時請勿說話或發出聲音。
- (4) 檢查過程中會給您氧氣使用及放置指尖血氧監測儀，以隨時了解您的狀況。
- (5) 若您在檢查過程時，有任何不適，請先舉手示意，勿試圖說話。

四、檢查後要注意些什麼？

- (1) 檢查結束後 2 小時內，請勿進食及飲水。2 小時後可試飲少量水，如喝水不會噎到或不舒服就可進食。
- (2) 結束檢查後可能會有頭暈現象，請於檢查室外休息 10 ~30 分鐘，如無不適再離開。
- (3) 在檢查結束後，有時會有少量的血絲痰，可再觀察。但若您有持續性血痰、血痰量增多、呼吸更急促或任何胸部不適症狀，請立即通知您的醫師或至急診就醫。

若您返家後有任何疑問，歡迎洽詢：

電話：(07) 8036783 轉 3211(支氣管鏡室)或 3360(呼吸治療室)

“小港醫院 支氣管鏡室 關心您”