



高雄市立小港醫院（委託財團法人高雄醫學大學經營） 認識乳房腫瘤微創式安可兒切除手術

乳房若發現腫瘤，經醫師評估需要手術治療時，其手術方式可採微創式安可兒切除手術；此手術是經由超音波導引及在超音波下進行腫瘤切除，透過真空切片的技術，完全取出腫瘤進行化驗，傷口僅有0.5公分，卻擁有傳統粗針切片的好處及效果，減少周邊組織缺損造成乳房凹陷變形，以維持身體美觀的外型。

一、微創式安可兒切除手術可用於

一般的良性乳房腫瘤，其實是可以不需手術，單純觀察即可，但是碰到以下幾種情形，可能需要進行切除：

- (一) 無法確定診斷：經由超音波檢查，外觀看起來像良性腫瘤但生長速度很快，或者切片結果是良性腫瘤，但外觀看起來卻讓人相當懷疑可能是惡性者。
- (二) 美觀上的考量：部份女性受荷爾蒙刺激的影響，有的乳房腫瘤大小為2-5公分，會影響外觀，開刀可以移除腫瘤回復正常外觀，同時也不影響正常乳腺的發育。
- (三) 手術切除可能惡性變化的腫瘤：有些腫瘤雖然診斷為良性，但其日後卻有惡性變化的機會，如乳突瘤等。

二、微創式安可兒切除手術的特點

相較於傳統手術，微創手術的優點主要有兩項：

- (一) 傷口小：一般傳統手術至少要2公分以上的傷口才能進行切除，甚至在一些較大腫瘤，可能需要快五公分的傷口才能切除，而安可兒微創手術僅不到一公分的傷口便可進行完整的切除。
- (二) 外觀不易變形：傳統的開刀方式，除了切除腫瘤外，容易破壞組織結構，所以在開完刀後，原先腫瘤的位置容易造成凹陷甚至變形，而微創手術不會有這些問題。
- (三) 手術時間短，約為20分鐘~30分鐘。

三、可能產生的副作用

使用微創安可兒手術的相關併發症這些併發症可能包含了皮膚、血管、肌肉、器官的受傷，出血、血腫及感染。

四、手術後照護

- (一) 傷口照護：依醫護人員指示執行傷口照護，以敷料或紗布覆蓋，換藥時可觀察傷口是否有紅、腫、熱、痛等感染發炎徵象，術後可使用彈繃加壓傷口二天。
- (二) 飲食原則：手術的飲食原則依醫護人員指示下執行，傷口復原期間避免刺激性食物。
- (三) 復健運動：必要時手術後即可開始依照醫護人員教導下，執行可負荷之手部復健運動。

五、居家照護

- (一) 依照醫師指示，定期返院複診。
- (二) 禁止抽煙、喝酒等刺激性食物。
- (三) 出院返家傷口會貼防水性敷料，可每2-3天自行更換敷料，保持傷口清潔乾燥。

若您返家後有任何疑問，可來電諮詢 (07) 8036783轉3602、3603 (6A病房) 或3622、3623 (6B病房)

小港醫院外科病房關心您