


# 用藥指導單張



KMSH PHARMACY ☺

## 泛得林定量噴霧劑 Ventolin Inhaler



113年7月制定

### 成份

Salbutamol 100 mcg/dose

短效乙二型刺激劑，每瓶共有 200劑

### 用途

氣喘、支氣管痙攣

### 使用方法

需要時使用**1~2劑**，每天不可超過**四次**

吸口蓋

金屬罐

吸入劑  
外殼

吸嘴

1. 擠壓吸口蓋的兩側，移除吸口蓋



2. 上下搖動吸入器，均勻混合藥物

※可接上吸藥輔助器



3. 向外吐一口氣

※請勿朝吸嘴吐氣



4. 將吸嘴放入口中，吸氣並同時按壓。金屬罐使藥品噴出，保持**穩定且深**的吸氣動作。

※拇指放在底部，食指放在頂部





# 泛得林定量噴霧劑 Ventolin Inhaler

## 使用方法



5. 將吸入器移開，**閉氣至少10秒**，即可恢復正常呼吸。若醫師指示需要吸入第二劑時，請**間隔30秒**再吸入下一個劑量。  
(重複步驟 3-5)



6. 使用後應將吸口蓋壓緊蓋好。

※平時使用完可用面紙清潔吸嘴

## 注意事項及警語

1. 至少**每週清潔一次**吸入器，從塑膠外殼取出金屬罐，並除去吸口蓋，以溫水徹底清洗啟動器。（★請勿將金屬罐放入水中）
2. 當**第一次使用吸入劑**或該吸入器**超過5天以上未使用**，先充分振搖，並**對空氣試噴2下**，以確定可以使用。

## 可能的副作用及處理方式

副作用並不常見，但還是可能發生。如：頭痛、暈眩、心跳過速。如有以上症狀，請於回診時告知醫師。

※ 以上內容不代表全部用藥資訊，如有任何疑問請向醫師、藥師或呼吸治療師詢問，亦可撥打藥物諮詢專線: (07)8036783分機3325/3152

小港醫院藥學科  為您的用藥安全把關

