

用藥指導單張



KMSH PHARMACY ☺

胰妥讚注射劑 Ozempic 4mg/3mL/Pen

Ozempic 4mg/3mL/Pen
胰妥讚注射劑



高雄醫學大學附設中和紀念醫院版權所有 110.11.09

112年05月制定

成份： Semaglutide(GLP-1類似物)，4mg/3mL/支

用途： 控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療

用法用量： 每7天一次，皮下注射



1. 使用前先洗手。



2. 酒精棉片消毒注射筆橡皮塞，再裝上針頭。



3. 將劑量設定鈕旋轉至排空符號「...」，按壓給藥按鈕，有藥液流出完成通暢測試。(只有新筆針需要排空)


4. 旋轉劑量調整鈕設定劑量

藥袋指示劑量	設定劑量刻度
每次 四分之一 毫克	從0算 18 格
每次 半 毫克	從0算 37 格
每次 1 毫克	轉到 1mg





胰妥讚注射劑Ozempic



5. 酒精棉片由內向外消毒注射部位(可注射部位為肚臍周圍一個拳頭外**腹部皮膚**、**大腿外側**、**上臂**)。



6. 按下給藥按鈕進行注射，直到顯示數字0，並且**停留至少6秒鐘**。



7. 將針頭外蓋套住針頭後以反方向旋轉移除，將注射筆筆蓋蓋回。
8. 針頭丟入硬殼容器的針頭回收桶。

注意事項及警語：

1. 開封前：儲存於2-8°C冰箱。開封後：存放於30°C以下或2-8°C冷藏，Ozempic藥品保存期限為**6週**，如未使用完應丟棄。
2. 如果**錯過一次劑量**，應該在**5天內儘快施打**。如果超過5天則應跳過，依原訂時程繼續注射下一劑。
3. 用完的針頭丟入防穿刺容器，送回醫院注射室回收。每次注射後請務必取下針頭，儲存胰妥讚注射劑時不可裝有針頭。這樣可避免針頭堵塞、污染、感染、藥物滲漏、劑量不準確。

可能的副作用及處理方式：

可能會有下列不舒服的情形，如**副作用持續沒有改善請立即聯絡醫師或藥師**。例如：噁心、偶痛、腹瀉，若情況嚴重則考慮停用，請於回診時告知醫師。

以上資料參考自Ozempic仿單，詳細資料請參考衛生福利部藥品仿單查詢平台 <https://mcp.fda.gov.tw/>

※以上內容不代表全部用藥資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師諮詢。
亦可撥打藥物諮詢專線：(07)-8036783 分機3325/3152

小港醫院藥學科



為您的用藥安全把關

