



# 高雄市立小港醫院（委託財團法人高雄醫學大學經營）





## 抗結核藥物副作用及注意事項

### 一、藥物種類、副作用及注意事項

抗結核病藥物之副作用大多數對身體影響不大，是安全的。但也有個別情況可出現比較嚴重的症狀。所以在使用藥物過程中，若有下列的副作用產生，病人應與醫師連絡，即時反映情況以便醫師能夠做及時有效的處理。

藥名	常見副作用及症狀	處理方式及注意事項
Isoniazid(INH) 300mg/Tab 異菸鹼醯肼錠 	周邊神經炎:肢端麻木或刺痛感	可食用富含 VitB 之食物，如糙米、小麥胚芽、豆莢類、牛奶。
	肝功能異常:疲倦感、噁心、嘔吐、食慾不振	注意有無黃疸或尿液顏色變深情形發生。 服藥期間請勿喝酒，因為會增加肝臟毒性。
	皮膚過敏:皮膚癢或紅斑	溫冷水洗澡可降低皮膚搔癢症狀。
	胃腸不適:腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉	可於食物一起服用或飯後、睡前服用。
Rifampin (RIF) 300mg/Cap 立泛黴素 	胃腸不適:腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉	可於食物一起服用或飯後、睡前服用。
	肝功能異常:疲倦感、噁心、嘔吐、食慾不振	1. 平日生活作息宜規律，避免熬夜或過度疲勞。 2. 應注意有無黃疸或尿液顏色變深情形發生。 3. 服藥期間請勿喝酒，因為會增加肝臟毒性。

藥名	常見副作用及症狀	處理方式及注意事項
	有可能發生類流感症狀： 寒顫、暈眩、頭痛、肌肉 及骨骼疼痛、顫抖、等症 狀	平日生活作息宜規律，避免 熬夜或過度疲勞。
Pyrazinamide (PZA)匹井安錠 500mg/Tab  	血清尿酸升高:關節痛	避免飲酒或食用高普林食 物，如香菇、內臟類、豆類 等，以免增加尿酸形成。
	肝功能異常:疲倦感、噁 心、嘔吐、食慾不振	平日生活作息宜規律，避免 熬夜或過度疲勞。 應注意有無黃疸或尿液顏色 變深情形發生。 服藥期間請勿喝酒，因為會 增加肝臟毒性。
	胃腸不適:腹痛、噁心、嘔 吐、腹瀉	可於食物一起服用或飯 後、睡前服用。
	皮膚過敏:皮膚癢或紅斑	溫冷水洗澡可降低皮膚搔癢 症狀。
Efbuto1 (EMB) 易復癆錠 400mg/Tab  	眼球後視神經炎： 視力模糊、紅綠色盲	平日應注意視力變化情形。 於回診時應告知醫師，由醫 師決定是否停藥。
	皮膚過敏:皮膚癢或紅斑	溫冷水洗澡可降低皮膚搔癢 症狀。
	肝功能異常:疲倦感、噁 心、嘔吐、食慾不振	平日生活作息宜規律，避免 熬夜或過度疲勞。 應注意有無黃疸或尿液顏色 變深情形發生。 服藥期間請勿喝酒，因為會 增加肝臟毒性。

藥名	常見副作用及症狀	處理方式及注意事項
AkuriT-3(RIF+INH+EMB)立剋核 	此藥為三合一抗結核藥物，副作用、症狀、處理方式及注意事項與上述相同。	
Rifinah(Rif300mg+INH150mg) 		
Rifinah(150mg) (RIF+INH) 樂肺寧糖衣錠 		
MACOX PLUS 300(Rif300mg+INH150mg) 		

二、若同時併用其他藥物需先和醫師討論。

若有任何問題請電洽  
 電話(07) 8036783 轉 3922 或 3923  
 小港醫院內科病房關心您